
REPRÉSENTATIONS DE L'ALGÈBRE DE LIE CONFORME SUR L'ESPACE DES DENSITÉS TENSORIELLES SUR LA SPHÈRE

PAR PASCAL REDOU

RÉSUMÉ. — Soit $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ l'espace des densités tensorielles sur $\mathbb{S}^n$ de degré λ (ou, de façon équivalente, des densités conformes de degré $-\lambda n$). Cet espace est muni d'une structure de $\text{Diff}(\mathbb{S}^n)$ - et de $\text{Vect}(\mathbb{S}^n)$ -module, et nous démontrons dans un premier temps qu'en tant que $\text{SO}(n+1, 1)$ -module, il est infinitésimalement équivalent au module associé à une représentation induite de la série principale du groupe connexe $\text{SO}_0(n+1, 1)$, plus précisément de la série sphérique nonunitaire sur l'espace $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{S}^n)$. A partir des propriétés de cette dernière, nous classifions selon les valeurs de λ les sous- $(\mathfrak{o}(n+1, 1), \text{SO}(n+1))$ -modules irréductibles et unitaires de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$.

ABSTRACT (*Representations of the conformal Lie algebra on the space of tensor densities on the sphere*)

Let $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ be the space of tensor densities on $\mathbb{S}^n$ with degree λ (or, equivalently, of conformal densities with degree λ). This space is embedded with a structure of $\text{Diff}(\mathbb{S}^n)$ - and $\text{Vect}(\mathbb{S}^n)$ -module, and we first prove that as a $\text{SO}(n+1, 1)$ -module, it is infinitesimally equivalent to an induced module from the principal series of the connected group $\text{SO}_0(n+1, 1)$, precisely from the nonunitary spherical series on the space $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{S}^n)$. In function of λ , $(\mathfrak{g}, K)$ -simple and unitary submodules of $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ are therefore classified.

PASCAL REDOU, Institut Girard Desargues, Université Claude Bernard Lyon 1, Bâtiment Braconnier (ex-101), 21 Avenue Claude Bernard, 69622 VILLEURBANNE Cedex, FRANCE
E-mail : redou@enib.fr

Classification mathématique par sujets (2000). — Géométrie différentielle et théorie des représentations.

Mots clefs. — Densités tensorielles, $(\mathfrak{g}, K)$ -modules, représentations induites.

1. Introduction et résultats principaux

L'espace $\mathcal{F}_\lambda(M)$ des densités tensorielles de degré λ sur une variété M est l'espace des sections lisses du fibré $\Delta_\lambda(M) = |\Lambda^n T^*M|^{\otimes \lambda}$ sur M . Cet espace est utilisé dans les problèmes liés à la quantification géométrique, et plus récemment dans le domaine de la quantification équivariante. Son introduction permet par exemple d'éviter l'écueil de la non compatibilité de l'action des opérateurs différentiels avec celle du groupe des difféomorphismes de M (et donc de l'algèbre de Lie $\text{Vect}(M)$) sur l'espace $\mathcal{C}^\infty(M)$: l'exemple le plus célèbre est l'espace des opérateurs de Sturm-Liouville $A = \frac{d^2}{dx^2} + u(x)$, qui agissent de $\mathcal{F}_{-\frac{1}{2}}(\mathbb{R})$ vers $\mathcal{F}_{\frac{3}{2}}(\mathbb{R})$. Il est de même aujourd'hui bien connu (voir par exemple [5]) que les seuls opérateurs différentiels linéaires conformément invariants (i.e. dont l'action commute avec celle de l'algèbre de Lie conforme $\mathfrak{o}(n+1,1)$) sur $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{R}^n)$ sont les “puissances du Laplacien” : pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe un unique (à constante près) opérateur différentiel linéaire $\mathfrak{o}(p+1, q+1)$ -invariant d'ordre k :

$$A_{2k} : \mathcal{F}_{\frac{n-2k}{2n}} \rightarrow \mathcal{F}_{\frac{n+2k}{2n}}$$

et il n'existe pas d'autres opérateurs différentiels linéaires $\mathfrak{o}(p+1, q+1)$ -invariants d'ordre $k \geq 1$ de $\mathcal{F}_\lambda$ vers $\mathcal{F}_\mu$.

De la même façon, la classification des opérateurs différentiels bilinéaires conformément invariants a été récemment effectuée ([13]), qui généralise la notion de transvectants ou de crochets de Rankin-Cohen.

Notre travail s'inscrit à la croisée de deux champs d'investigation : celui de la géométrie bien sûr, eu égard à la prépondérance des densités tensorielles dans le domaine de la géométrie différentielle, et, partant, de la physique théorique, mais également celui de la théorie des représentations, l'enjeu étant la classification exhaustive des espaces $\mathcal{F}_\lambda(M)$ en tant que $\text{Diff}(M)$ -modules (sous-modules, modules équivalents, etc.)

Dans cet article, nous considérons précisément l'espace $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ des densités tensorielles sur la sphère $\mathbb{S}^n$. Le sens géométrique de cette étude réside dans le fait que le groupe conforme $\text{SO}(n+1,1)$ agit naturellement sur $\mathbb{S}^n$, ce qui confère à $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ une structure de $\text{SO}(n+1,1)$ -module, et par conséquent de $\mathfrak{o}(n+1,1)$ - et de $\text{SO}(n+1)$ -module. Nous ferons naturellement usage de la classification des représentations du groupe conforme, décrite par M. Takeshi Hirai ([9]) ainsi que MM. Klimyk et Gavrilik ([10]).

Donnons quelques précisions sur les résultats que nous allons démontrer et les méthodes employées :

Rappelons que si G est un groupe de Lie, K un sous-groupe compact de G , et $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{k}$ sont leurs algèbres de Lie respectives, on appelle $(\mathfrak{g}, K)$ -module un espace vectoriel complexe E muni d'une représentation de $\mathfrak{g}$ et d'une représentation de K vérifiant

1. $(\text{Ad}k \cdot X) \cdot e = k \cdot X \cdot k^{-1} \cdot e \quad \forall k \in K, X \in \mathfrak{g}, e \in E$
2. pour tout $e \in E$, $K \cdot e$ engendre un sous-espace vectoriel de dimension finie F (on dit que e est K -fini), la représentation de K dans F est continue et on a, pour tout $X \in \mathfrak{k}$, $X \cdot e = \frac{d}{dt}(\exp tX) \cdot e|_{t=0}$.

Nous notons à présent $G = \text{SO}_0(n+1, 1)$, composante connexe de l'identité dans $\text{SO}(n+1, 1)$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}(n+1, 1)$, $K = \text{SO}(n+1)$, et $\mathcal{H}(K)$ l'espace des vecteurs K -finis de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$. Le résultat final de notre travail est la classification, selon les valeurs de λ , des sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples et unitaires de $\mathcal{H}(K)$.

Dans un premier temps, nous démontrons que la représentation du groupe conforme $\text{SO}(n+1, 1)$ sur $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ est infinitésimalement équivalente à une représentation induite de la série principale du groupe $G = \text{SO}_0(n+1, 1)$, plus précisément de la série dite sphérique nonunitaire : notons $G = KAN$ la décomposition d'Iwasawa de G , ρ la demi-somme des racines restreintes positives de la paire $(\mathfrak{o}(n+1, 1), \mathfrak{a})$, $A = \exp \mathfrak{a}$. Nous considérons la représentation induite par le sous-groupe parabolique minimal MAN de G , en faisant le choix de la représentation triviale du sous-groupe $M = \text{SO}(n)$, centralisateur de A dans K , et d'une représentation μ de dimension 1 de A . Nous noterons, pour tout élément h de A , $\mu(h) = \exp(\nu(\log h))$, $\nu \in \mathfrak{a}^*$. Les notations assimilent un élément de $\mathfrak{a}^*$ et sa valeur en l'élément matriciel $H = E_{n+1, n+2} + E_{n+2, n+1}$. La décomposition d'Iwasawa montre que la représentation induite en question, que nous noterons $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu)$, prend effet sur l'espace des fonctions de $\mathcal{L}^2(K/M) = \mathcal{L}^2(\mathbb{S}^n)$, et les opérateurs de cette représentation sont donnés, pour $g \in G$, par

$$\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu)(g)f(k) = \exp(-\nu(\log h))f(k_g), \text{ avec } g^{-1}k = k_g h n \in KAN.$$

Lorsque ν varie dans $\mathbb{C}$, nous obtenons ainsi les représentations de la série dite *sphérique nonunitaire*, qui munissent l'espace $\mathcal{L}^2(\mathbb{S}^n)$ d'une structure de G -module. Nous désignons alors par $\mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n)$ le sous-module formé des éléments de classe $\mathcal{C}^\infty$. Nous démontrons le résultat-clé suivant :

THÉORÈME 1.1. — $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ et $\mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n)$ sont des $\mathfrak{g}$ -modules isomorphes si et seulement si $\nu = n\lambda$, et cet isomorphisme est compatible avec l'action de K .

La démonstration de ce résultat présente l'intérêt (et la difficulté!) d'exposer des calculs explicites sur un groupe de Lie, en l'occurrence le groupe conforme, au moyen notamment de la décomposition d'Iwasawa. Elle s'appuie par ailleurs sur des considérations cohomologiques simples mais d'une grande utilité.

En utilisant les propriétés des représentations de la série sphérique nonunitaire, nous classifions dans un second temps les sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples et unitaires de $\mathcal{H}(K)$. Cette classification est la suivante :

- THÉORÈME 1.2. — 1. Si $\lambda \neq l/n$ pour tout $l \in \mathbb{Z}$, ou si, pour $n > 1$, $\lambda \in \{\frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}\}$, alors $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ contient un unique $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple $\mathcal{H}(K)$, qui s'identifie à l'espace des polynômes harmoniques en les coordonnées cartésiennes sur $\mathbb{S}^n$. Ce module est unitaire si et seulement si $\lambda = \frac{1}{2} + i\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$, ou $\lambda \in]0, 1[\setminus \{\frac{1}{2}\}$.
2. Si $\lambda = -l/n$, $l \in \mathbb{N}$, $\mathcal{H}(K)$ admet un unique sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple, de dimension finie, formé de ses éléments de degré $\leq l$. Il est de plus unitaire pour $\lambda = 0$.
3. Si $n = 1$ et $\lambda = l$, $l \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{H}(K)$ admet deux sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples, unitaires et de dimension infinie, dont la somme est l'ensemble des éléments de $\mathcal{H}(K)$ de degré $\geq l$.
4. Si $n > 1$ et $\lambda = 1 + l/n$, $l \in \mathbb{N}$, $\mathcal{H}(K)$ admet un sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple, unitaire pour $\lambda = 0$ et de dimension infinie, formé de ses éléments de degré $\geq l + 1$.

REMARQUE 1.3. — Le résultat obtenu contient également la classification des sous-quotients simples de l'espace des vecteurs K -finis, ce que la démonstration mettra en exergue.

D'autre part, nous obtenons dans le même temps tous les sous- G -modules fermés de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ (d'après [11], théorème 8.9.), et la connexité de G implique que l'on obtient dans le cas (2) du théorème 1.2 tous les sous $\mathfrak{g}$ -modules simples de dimension finie de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$.

Nous commencerons par présenter l'espace des densités tensorielles sur la sphère, puis la série sphérique nonunitaire du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, pour entreprendre ensuite la démonstration des théorèmes 1.1 et 1.2.

2. Densités tensorielles

2.1. Structures de $\mathfrak{g}$ - et K -module. — Soit $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ l'espace des densités tensorielles de degré $\lambda \in \mathbb{C}$ sur la sphère $\mathbb{S}^n$. Cet espace est de façon naturelle muni d'une structure de $\mathrm{Diff}(\mathbb{S}^n)$ - et $\mathrm{Vect}(\mathbb{S}^n)$ -module. En tant qu'espace vectoriel, $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ est isomorphe à l'espace de fonctions lisses à valeurs complexes $\mathcal{C}_\mathbb{C}^\infty(\mathbb{S}^n)$, mais l'action d'un champ de vecteurs $X = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial x_i}$ de l'algèbre de Lie $\mathrm{Vect}(\mathbb{S}^n)$ est donnée par la dérivée de Lie de degré λ

$$(1) \quad L_X^\lambda = X^i \frac{\partial}{\partial x_i} + \lambda \mathrm{Div}(X),$$

indépendamment du choix du système de coordonnées. Explicitement, si $\varphi \in \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, et si nous notons Ω la forme de volume

$$\Omega = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n,$$

la formule (1) se lit

$$L_X^\lambda(\varphi(x_1, \dots, x_n)(\Omega)^\lambda) = \sum_{i=1}^n (X^i \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \lambda \frac{\partial X^i}{\partial x_i} \varphi)(x_1, \dots, x_n)(\Omega)^\lambda.$$

L'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1, 1)$ des transformations conformes infinitésimales, que nous désignons plus brièvement par algèbre de Lie conforme, est engendrée par les champs de vecteurs

$$(2) \quad \begin{aligned} X_i &= \frac{\partial}{\partial s_i} \\ X_{ij} &= s_i \frac{\partial}{\partial s_j} - s_j \frac{\partial}{\partial s_i} \\ X_0 &= \sum_i s_i \frac{\partial}{\partial s_i} \\ \bar{X}_i &= \sum_j (s_j^2 \frac{\partial}{\partial s_i} - 2s_i s_j \frac{\partial}{\partial s_j}) \end{aligned}$$

où $(s_1, \dots, s_n)$ sont les coordonnées *stéréographiques* sur la sphère $\mathbb{S}^n$.

Nous considérons l'espace $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ comme un $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}(n+1, 1)$ -module, au moyen de la formule (1) et des champs de vecteurs (2). D'autre part, nous déduisons de l'action du groupe $\text{Diff}(\mathbb{S}^n)$ celle du sous-groupe $K = \text{SO}(n+1)$, donnée par la représentation dite régulière à gauche

$$(3) \quad (k_0 \cdot f)(k) = f(k_0^{-1}k),$$

où $k_0 \in K$, $k \in \mathbb{S}^n \simeq \text{SO}(n+1)/\text{SO}(n)$. La structure de K -module de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ est donc ainsi explicitée.

Nous décrivons ci-après comment nous pouvons utiliser les coordonnées cartésiennes pour décrire la structure de $\mathfrak{g}$ -module de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, ce dont nous ferons usage par la suite.

2.2. Module des fonctions homogènes sur $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. — Nous notons $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$ l'espace des fonctions lisses sur $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, homogènes de degré $-(n+1)\lambda$, i.e. telles que

$$f(\alpha x_0, \dots, \alpha x_n) = \alpha^{-(n+1)\lambda} f(x_0, \dots, x_n), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}.$$

Cet espace est naturellement muni d'une structure de $\text{Vect}(\mathbb{R}^{n+1})$ -module, l'action d'un vecteur étant donnée par la dérivée de Lie le long de ce vecteur. Désignons par $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} |_{\mathbb{S}^n})$ la restriction de cet espace aux fonctions sur $\mathbb{S}^n$. Nous lui attribuons une structure de $\text{Diff}(\mathbb{S}^n)$ -module, héritée de celle de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, de la manière suivante :

PROPOSITION 2.1. — ([14]) *L'espace $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ est isomorphe en tant que $\text{Diff}(\mathbb{S}^n)$ -module à l'espace $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} |_{\mathbb{S}^n})$.*

Explicitement, si $\varphi \in \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ et si nous notons $t_1, \dots, t_n$ les coordonnées *projectives* sur $\mathbb{S}^n$ et $x_0, x_1, \dots, x_n$ les coordonnées *cartésiennes* sur $\mathbb{R}^{n+1}$, cet isomorphisme, que nous appelons *relèvement*, est donné par

$$(4) \quad \varphi(t_1, \dots, t_n)(dt_1 \wedge \dots \wedge dt_n)^\lambda \longmapsto \varphi\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right)(x_0)^{-(n+1)\lambda}.$$

Bien entendu, il correspond à ce relèvement un “relèvement des champs de vecteurs”, faisant correspondre aux champs (2) qui agissent par la dérivée de Lie de degré λ sur $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, des champs de vecteurs en coordonnées cartésiennes, qui agissent par la dérivée de Lie standard (degré 0) sur $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$. N'en ayant pas ici l'utilité, nous n'explicitons pas ces champs.

2.3. Polynômes harmoniques. — Par la suite, il nous sera nécessaire de nous placer alternativement dans chacun des espaces $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} |_{\mathbb{S}^n})$ et $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, utilisant à cette fin l'isomorphisme que nous venons de décrire. Nous ferons en particulier un large usage des polynômes harmoniques dans $\mathbb{R}^{n+1} |_{\mathbb{S}^n}$, i.e des polynômes en les $n+1$ variables réelles $x_0, \dots, x_n$, restreints à la sphère et appartenant au noyau du Laplacien standard

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_0^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}.$$

Parmi ces polynômes, nous considérons en particulier les éléments

$$\psi_{il} = (x_0 + \mathbf{i}x_i)^l,$$

où nous avons noté $\mathbf{i} = \sqrt{-1}$. Afin d'expliciter un exemple concret, mais aussi parce que nous en aurons besoin, montrons comment ψ_{il} peut être considéré comme un élément de l'espace $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$: à l'aide de la relation $x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1$, nous obtenons

$$\psi_{il} = \frac{(x_0 + \mathbf{i}x_i)^l}{(x_0^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{l}{2} + \lambda \frac{n+1}{2}}},$$

et vérifions facilement que $\psi_{il} \in C_{-(n+1)\lambda}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} |_{\mathbb{S}^n})$.

REMARQUE 2.2. — L'action d'un élément de l'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1)$ sur ψ_{il} ne fait pas intervenir λ : il suffit d'appliquer un opérateur infinitésimal $x_k \frac{\partial}{\partial x_l} - x_l \frac{\partial}{\partial x_k}$ de $\mathfrak{o}(n+1)$ pour s'en convaincre.

Utilisant maintenant l'isomorphisme (4), nous obtenons l'image de ψ_{il} dans $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$:

$$\psi_{il} = \frac{(1 + \mathbf{i}t_i)^l}{(1 + t_1^2 + \dots + t_n^2)^{\frac{l}{2} + \lambda \frac{n+1}{2}}} (dt_1 \wedge \dots \wedge dt_n)^\lambda$$

(par commodité nous la désignons aussi par ψ_{il}), cette expression étant évidemment donnée en coordonnées projectives. Il nous reste alors à appliquer les champs (2) exprimés dans ces coordonnées, si nous souhaitons

obtenir les images de ψ_{il} par l'action des champs de $\mathfrak{o}(n+1, 1)$. Utilisant à nouveau (4), nous obtiendrons les expressions de ces images dans l'espace $C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} |_{\mathbb{S}^n})$.

3. Représentations de la série sphérique nonunitaire

L'idée principale de notre travail de classification réside dans l'identification de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ comme module induit : il s'agit d'un module de la série principale des représentations du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, plus précisément de la série dite sphérique nonunitaire. Nous décrivons ci-après la construction de cette série (que l'on trouvera exposée dans l'ouvrage [16] de MM. Klymuk et Vilenkin).

3.1. Description. — Avant de considérer plus précisément le groupe conforme, nous donnons quelques résultats généraux. Soit G un groupe de Lie linéaire non compact, K son sous-groupe compact maximal. On note $\mathfrak{g}$ l'algèbre de Lie de G , et $\mathfrak{k}$ celle de K , qui est une sous-algèbre de $\mathfrak{g}$. Il existe dans $\mathfrak{g}$ un isomorphisme involutif θ , l'involution de Cartan, pour lequel $\mathfrak{k}$ est le sous-espace stationnaire. Le sous-espace $\{X : \theta X = -X\}$ dans $\mathfrak{g}$ est noté $\mathfrak{p}$. Nous avons alors

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{p}.$$

Cette décomposition se transforme par l'application exponentielle $\mathfrak{g} \longrightarrow G$, en la décomposition $G = KP$ de G , où $P = \exp \mathfrak{p}$.

Soit $\mathfrak{a}$ une sous-algèbre commutative maximale de $\mathfrak{p}$. La dimension de $\mathfrak{a}$ est appelée le rang de $\mathfrak{g}$ et de G . Le sous-groupe

$$A = \exp \mathfrak{a}$$

est commutatif.

Les opérateurs de représentation adjointe $\mathrm{ad}H$, $H \in \mathfrak{a}$, sont anti-hermitiens pour le produit

$$\langle X, Y \rangle = -\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}X \mathrm{ad}(\theta Y)), \quad X, Y \in \mathfrak{g},$$

et par conséquent nous avons la décomposition

$$(5) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 + \sum_{\gamma} \mathfrak{g}_{\gamma},$$

où $\mathfrak{g}_0$ est le noyau de l'opérateur $\mathrm{ad}H$ et $\mathfrak{g}_{\gamma}$ correspond aux valeurs propres $\gamma(H)$, $H \in \mathfrak{a}$. La décomposition (5) est orthogonale. Les formes linéaires γ sont appelées *racines restreintes* de la paire $(\mathfrak{g}, \mathfrak{a})$, et les sous-espaces $\mathfrak{g}_{\gamma}$ sont les *sous-espaces radiciels*.

Si $H_1, \dots, H_l$ est une base de $\mathfrak{a}$, et si le premier nombre non nul dans la suite $\{\gamma(H_1), \dots, \gamma(H_l)\}$ est positif (resp. négatif), alors la racine γ est dite positive

(resp. négative). La dimension de $\mathfrak{g}_\gamma$ est appelée multiplicité de γ , et est notée $m(\gamma)$. Posons

$$(6) \quad \rho = \frac{1}{2} \sum_{\gamma > 0} m(\gamma) \gamma.$$

La somme

$$\mathfrak{n} = \sum_{\gamma > 0} \mathfrak{g}_\gamma$$

est une sous-algèbre nilpotente maximale de $\mathfrak{g}$, et

$$N = \exp \mathfrak{n}$$

est un sous-groupe nilpotent maximal de G .

Le groupe G admet une décomposition d'Iwasawa

$$G = KAN,$$

ce qui signifie que chaque élément $g \in G$ peut être écrit de manière unique $g = khn$, où $k \in K$, $h \in A$, $n \in N$. De plus l'application $(k, h, n) \mapsto khn$ est un difféomorphisme analytique de $K \times A \times N$ vers G .

Soit M le centralisateur de A dans K . Le sous-groupe

$$P = MAN$$

est appelé sous-groupe parabolique minimal de G . Un sous-groupe P' contenant P et différent de G est appelé sous-groupe parabolique. Un tel groupe s'obtient par extension de $P = MAN$ en $P' = M'AN$, où $M \subset M' \subset K$.

Soient G, K, A, M, N, P les groupes ainsi définis. Nous choisissons une représentation de dimension 1

$$\mu(h) = \exp(\nu(H)), \quad h \in \exp H,$$

du sous-groupe $A = \exp \mathfrak{a}$. Alors la correspondance

$$p = mhn \mapsto \delta(mhn) = \mu(h)$$

définit une représentation de dimension 1 du sous-groupe parabolique minimal P . Cette représentation induit une représentation $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu)$ du groupe G , que nous noterons par souci de concision I_ν , agissant sur l'espace des fonctions f sur G qui satisfont à la condition

$$(7) \quad f(gp) = \mu(h^{-1})f(g), \quad p = mhn \in P.$$

Les opérateurs $I_\nu(g_0)$, $g_0 \in G$, agissent sur ces fonctions par la formule

$$I_\nu(g_0)f(g) = f(g_0^{-1}g).$$

Nous appelons ces représentations $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu) = I_\nu$ *représentations de la série sphérique nonunitaire*.

Si des fonctions f sur G satisfont à la condition (7), elles sont déterminées par leurs valeurs sur un certain sous-groupe de G : la décomposition d'Iwasawa

$G = KAN$ montre qu'elles sont déterminées par leurs valeurs sur K , et la relation

$$(8) \quad f(km) = f(k), \quad m \in M,$$

est satisfaite.

Les opérateurs $I_\nu(g)$ sont donnés par la formule

$$I_\nu(g)f(k) = \mu(h^{-1})f(k_g),$$

où $h \in A$ et $k_g \in K$ sont définis par la décomposition d'Iwasawa

$$g^{-1}k = k_g h n$$

de l'élément $g^{-1}k$.

Le produit scalaire

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_K f_1(k) \overline{f_2(k)} dk$$

est introduit dans l'espace des fonctions sur K . La relation (8) signifie que ces fonctions sont en fait des fonctions sur le groupe quotient K/M .

Les représentations I_ν sont par conséquent réalisées dans l'espace des fonctions sur K/M .

3.2. Décomposition du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$. — Pour ce groupe, nous avons $K \cong \mathrm{SO}(n+1)$: tout élément de K s'écrit en effet sous la forme

$$k = \left[\begin{array}{c|c} R & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right]$$

où $R \in \mathrm{SO}(n+1)$.

D'autre part, le sous-groupe A est constitué des matrices

$$(9) \quad h_{n+1}(t) = \left[\begin{array}{c|c} I_n & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \begin{smallmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{smallmatrix} \end{array} \right],$$

où I_n est la matrice identité de type (n, n) .

Nous noterons H l'élément de $\mathfrak{o}(n+1, 1)$ tel que $h_{n+1}(t) = \exp tH$. Ainsi,

$$(10) \quad H = E_{n+1, n+2} + E_{n+2, n+1},$$

où E_{ij} est la matrice dont les coefficients sont les $(E_{ij})_{rs} = \delta_{ir}\delta_{js}$.

Le groupe M est isomorphe à $\mathrm{SO}(n)$. Le groupe N est constitué des matrices

$$(11) \quad n(\mathbf{a}) = \left[\begin{array}{c|cc} I_n & \mathbf{a}^t & -\mathbf{a}^t \\ \hline -\mathbf{a} & 1 - \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} & \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} \\ -\mathbf{a} & -\frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} & 1 + \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} \end{array} \right],$$

où $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, et $\|\mathbf{a}\|^2 = \sum a_j^2$. Nous vérifions facilement que N est ici abélien.

En dernier lieu, pour $g \in \mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, le paramètre t de $h_{n+1}(t) \in A$, dans la décomposition d'Iwasawa $g = kh_{n+1}(t)n$, $g \in \mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, est donné par $t = \ln[\mathbf{x}_0, g\xi_0]$, où $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = x^1 y^1 + \dots + x^{n+1} y^{n+1} - x^{n+2} y^{n+2}$, $\xi_0 = (0, \dots, 0, 1, 1)$, et $\mathbf{x}_0 = (0, \dots, 0, 1)$.

3.3. Série sphérique nonunitaire du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$. — Nous avons ici

$$\mathfrak{a} = \{t(E_{n+1, n+2} + E_{n+2, n+1}), t \in \mathbb{R}\},$$

ainsi les caractères du sous-groupe A et, partant, les représentations $\mathrm{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu) = I_\nu$ de la série sphérique nonunitaire du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, sont-ils donnés par un nombre complexe $\nu = \nu(H)$, où H est donné par (10). On notera donc ultérieurement $\nu(H) = \nu$ et $\rho(H) = \rho$, ρ étant défini par (6). Nous avons alors en particulier $\rho = \frac{n}{2}$.

Puisque, pour $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, nous avons $K = \mathrm{SO}(n+1)$ et $M = \mathrm{SO}(n)$, les représentations I_ν sont réalisées dans l'espace $\mathcal{L}^2(\mathbb{S}^n)$ des fonctions de carré intégrable sur la sphère

$$\mathbb{S}^n = \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

De telles fonctions peuvent être considérées comme fonctions des coordonnées sphériques $\theta_1, \dots, \theta_n$ sur $\mathbb{S}^n$. En effet considérons l'élément P de $\mathbb{S}^n$, de coordonnées sphériques $(\theta_1, \dots, \theta_n)$. Nous avons alors en coordonnées cartésiennes $(x_0, \dots, x_n)$

$$P \begin{pmatrix} \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n \\ \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n \\ \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_n \\ \vdots \\ \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n \\ \cos \theta_n \end{pmatrix}.$$

De plus, l'application

$$(12) \quad \varphi : \mathrm{SO}(n+1) \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad \varphi(g) = g e_{n+1},$$

où e_{n+1} a pour coordonnées cartésiennes $(0, \dots, 0, 1)$, donne le difféomorphisme

$$\mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \cong \mathbb{S}^n,$$

puisque le stabilisateur de e_{n+1} dans $\mathrm{SO}(n+1)$ est donné par les matrices

$$\left[\begin{array}{c|c} R \in \mathrm{SO}(n) & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right].$$

Dans cet isomorphisme, à l'élément $P \in \mathbb{S}^n$ donné ci-dessus correspond la classe

$$\left[\begin{array}{c|c} R \in \mathrm{SO}(n) & \begin{array}{c} \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n \\ \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n \\ \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_n \\ \vdots \\ \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n \end{array} \\ \hline \mathbf{0} & \cos \theta_n \end{array} \right] \in \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n).$$

Nous allons maintenant déterminer l'expression

$$(13) \quad I_\nu(g)f(k) = \mu(h^{-1})f(k_g),$$

où $k \in K/M \cong \mathbb{S}^n$, $g^{-1}k = k_g h n \in KAN$, pour $g \in A$ et $g \in N$.

Notons k_i la rotation d'angle θ_i dans le plan (e_i, e_{i+1}) , donnée par

$$k_i = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ & \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ & -\sin \theta_i & \cos \theta_i \\ & & \ddots \\ 0 & & 0 & 1 \end{array} \right] \in K = \mathrm{SO}(n+1).$$

De même, k'_i désignera une semblable rotation, d'angle θ'_i .

A l'élément $P \in \mathbb{S}^n$ présenté plus haut correspond la classe d'équivalence dans $\mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)$ de l'élément $k_1 k_2 \cdots k_n$, puisque la $n+1$ -ème colonne de l'élément $k_1 k_2 \cdots k_n$ est précisément formée des coordonnées cartésiennes de

P . Nous avons en effet (comme élément du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$),

$$k_1 k_2 \cdots k_n =$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \cos \theta_2 & \cdots & \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_n & \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \cos \theta_2 & \cdots & \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_n & \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n & 0 \\ 0 & -\sin \theta_2 & \cdots & \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_n & \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\sin \theta_n & \cos \theta_n & 0 \\ 0 & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

• Considérons tout d'abord $g \in A$, $g = h_{n+1}(t)$ comme dans (9), et posons $k = k_1 k_2 \cdots k_n \in K/M$. Utilisant alors la décomposition d'Iwasawa et le fait que $g \in A$ commute avec chaque élément k_i appartenant à $M = \mathrm{SO}(n)$, nous obtenons

$$g^{-1}k = k_g h n, \quad h = h_{n+1}(u), \quad n \in N,$$

où k_g est du type

$$k_g = k_1 k_2 \cdots k_{n-1} k'_n,$$

k'_n étant caractérisée par l'angle θ'_n , tel que

$$(14) \quad \cos \theta'_n = \frac{\cos \theta_n \cosh t - \sinh t}{\cosh t - \cos \theta_n \sinh t}.$$

D'autre part une identification matricielle directe nous donne $g^{-1}k = k_g h n$, $h = h_{n+1}(u)$, où

$$e^u = \cosh t - \cos \theta_n \sinh t.$$

Enfin, au moyen de l'isomorphisme donné par (12), nous obtenons la relation

$$(15) \quad I_\nu(h_{n+1}(t))f(\theta_1, \dots, \theta_n) = (\cosh t - \cos \theta_n \sinh t)^{-\nu} f(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}, \theta'_n),$$

où θ'_n est donné par (14).

• Considérons à présent le cas $g \in N$, $g = n(\mathbf{a})$, comme dans (11) :

À nouveau nous posons $k = k_1 k_2 \cdots k_n \in K/M$, et nous écrivons la décomposition d'Iwasawa pour $g^{-1}k$. Chaque élément du groupe quotient $K/M = \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)$ est du type

$$k_g = k'_1 k'_2 \cdots k'_n m, \quad m \in \mathrm{SO}(n).$$

Un calcul matriciel direct nous conduit à l'identification

$$g^{-1}k = k_g h n \iff n(\mathbf{a})^{-1} k_1 k_2 \cdots k_n = k'_1 k'_2 \cdots k'_n m h_{n+1}(u) n(\alpha),$$

où $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Il convient de remarquer que u et θ'_i , $1 \leq i \leq n$ doivent être déterminés, afin d'obtenir l'expression (13). L'identification ci-dessus nous conduit aux relations :

$$\begin{aligned}
e^u &= 1 + \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} + a_1 \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n + a_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n \\
&\quad + \cdots + a_n \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n - \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} \cos \theta_n; \\
\cos \theta'_n &= e^{-u} \left(\frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} + a_1 \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n + a_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n \right. \\
&\quad \left. + \cdots + a_n \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n + \left(1 - \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2}\right) \cos \theta_n \right); \\
&= 1 + \frac{\cos \theta_n - 1}{e^u}; \\
\cos \theta'_{n-1} \sin \theta'_n &= e^{-u} (a_n + \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n - a_n \cos \theta_n); \\
\cos \theta'_{n-2} \sin \theta'_{n-1} \sin \theta'_n &= e^{-u} (a_{n-1} + \cos \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \sin \theta_n - a_{n-1} \cos \theta_n); \\
&\quad \vdots \\
\cos \theta'_1 \sin \theta'_2 \cdots \sin \theta'_n &= e^{-u} (a_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n - a_2 \cos \theta_n) \\
\sin \theta'_1 \sin \theta'_2 \cdots \sin \theta'_n &= e^{-u} (a_1 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n - a_1 \cos \theta_n).
\end{aligned}$$

Ces égalités nous mènent enfin aux relations de récurrence suivantes :

$$\begin{aligned}
\tan \theta'_1 &= \frac{a_1 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n - a_1 \cos \theta_n}{a_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n - a_2 \cos \theta_n}; \\
\cos \theta'_1 \tan \theta'_2 &= \frac{a_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n - a_2 \cos \theta_n}{a_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_n - a_3 \cos \theta_n}; \\
&\quad \vdots \\
\cos \theta'_{n-2} \tan \theta'_{n-1} &= \frac{a_{n-1} + \cos \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \sin \theta_n - a_{n-1} \cos \theta_n}{a_n + \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n - a_n \cos \theta_n}; \\
\cos \theta'_n &= 1 + \frac{\cos \theta_n - 1}{e^u};
\end{aligned}
\tag{16}$$

$$\begin{aligned}
e^u &= 1 + \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} + a_1 \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n + a_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_n \\
&\quad + \cdots + a_n \cos \theta_{n-1} \sin \theta_n - \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{2} \cos \theta_n.
\end{aligned}
\tag{17}$$

En conséquence, l'action d'un élément du groupe nilpotent N est donnée par

$$(18) \quad I_\nu(n(\mathbf{a}))f(\theta_1, \dots, \theta_n) = (e^u)^{-\nu} f(\theta'_1, \dots, \theta'_{n-1}, \theta'_n),$$

où θ'_i , $1 \leq i \leq n$ et e^u sont donnés par les égalités (16) et (17).

3.4. Série sphérique nonunitaire pour l'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1, 1)$.

— Dans cette partie, nous décrivons la représentation infinitésimale associée à la série sphérique nonunitaire. Notons dI_ν (ou encore $d\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu)$) cette représentation, qui est donc bien entendu une représentation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1, 1)$.

Considérons tout d'abord l'élément $H = E_{n+1, n+2} + E_{n+2, n+1}$. Nous avons

$$h_{n+1}(t) = \exp(tH),$$

où $h_{n+1}(t)$ est donné par (9), si bien que

$$dI_\nu(H)f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \frac{d}{dt} \left(I_\nu(h_{n+1}(t))f(\theta_1, \dots, \theta_n) \right) \Big|_{t=0}.$$

A l'aide de (15) nous obtenons directement

$$(19) \quad dI_\nu(H)f = \nu \cos \theta_n f + \sin \theta_n \frac{\partial f}{\partial \theta_n}.$$

Nous considérons à présent les éléments de l'algèbre de Lie nilpotente $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{o}(n+1, 1)$,

$$\mathfrak{n}_i = E_{i, n+1} - E_{n+1, i} - E_{i, n+2} - E_{n+2, i}.$$

Ces éléments constituent une base de $\mathfrak{n}$, et nous avons, pour $n(\mathbf{a})$ défini par (11),

$$n(\mathbf{a}) = \exp(a_1 \mathfrak{n}_1 + \dots + a_n \mathfrak{n}_n),$$

de telle sorte que

$$\begin{aligned} dI_\nu(\mathfrak{n}_1)f(\theta_1, \dots, \theta_n) &= \frac{d}{dt} \left(I_\nu(n(a_1, 0, \dots, 0))f(\theta_1, \dots, \theta_n) \right) \Big|_{a_1=0} \\ dI_\nu(\mathfrak{n}_2)f(\theta_1, \dots, \theta_n) &= \frac{d}{dt} \left(I_\nu(n(0, a_2, 0, \dots, 0))f(\theta_1, \dots, \theta_n) \right) \Big|_{a_2=0} \\ &\vdots \\ dI_\nu(\mathfrak{n}_n)f(\theta_1, \dots, \theta_n) &= \frac{d}{dt} \left(I_\nu(n(0, 0, \dots, 0, a_n))f(\theta_1, \dots, \theta_n) \right) \Big|_{a_n=0}. \end{aligned}$$

Au moyen des expressions (16), (17) et (18), nous aboutissons aux résultats suivants :

$$\begin{aligned}
 dI_\nu(\mathbf{n}_1)f &= -\nu \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n f \\
 (20) \quad &+ (1 - \cos \theta_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \frac{\partial f}{\partial \theta_i} \\
 &- (1 - \cos \theta_n) \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial f}{\partial \theta_n};
 \end{aligned}$$

et, pour $1 \leq i \leq n-1$,

$$\begin{aligned}
 dI_\nu(\mathbf{n}_{i+1})f &= -\nu \cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n f \\
 (21) \quad &- (1 - \cos \theta_n) \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} \frac{\partial f}{\partial \theta_i} \\
 &+ (1 - \cos \theta_n) \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \cos \theta_j \frac{\partial f}{\partial \theta_j} \\
 &- (1 - \cos \theta_n) \cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial f}{\partial \theta_n}.
 \end{aligned}$$

REMARQUE 3.1. — Dans ces formules, les notations du type $\frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n}$ ou $\frac{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_j \cdots \sin \theta_n}$, bien que peu élégantes, permettent une meilleure lisibilité pour certaines valeurs de i ou de j . Il faut d'autre part noter que pour le cas $i = n-1$, l'expression $\cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_{n-1}$ se lit $\cos \theta_{n-1}$. Nous adopterons cette convention dans toute la suite.

Nous avons donc entièrement décrit les représentations de la série sphérique nonunitaire de l'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1, 1)$. Notre méthode consiste à identifier $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ comme un module particulier de cette série. Nous allons à présent procéder à cette identification.

4. Preuve du théorème 1.1

4.1. Dérivée de Lie de degré λ en coordonnées sphériques. — Effectuons les changements de carte nécessaires pour établir l'équivalence cherchée.

4.1.1. Changement de carte dans $\mathfrak{o}(n+1, 1)$. — En vue de notre démonstration, il nous faut écrire les champs de vecteurs (2) de l'algèbre de Lie conforme en termes de coordonnées sphériques, et en déduire les expressions

$$L_X^\lambda \left(f(\theta_1, \dots, \theta_n) (d\theta_1 \wedge \cdots \wedge d\theta_n)^\lambda \right).$$

Nous n'aurons en fait besoin que des expressions de X_0 et des champs non affines $\bar{X}_i$, pour $1 \leq i \leq n$; en effet des vérifications directes montrent que le champ X_0 engendre la sous-algèbre $\mathfrak{a}$ de dimension 1, et nous avons, avec la représentation adjointe dans $\mathfrak{o}(n+1, 1)$,

$$\text{ad}_{X_0}(X_i) = -X_i, \quad \text{ad}_{X_0}(\bar{X}_i) = +\bar{X}_i,$$

si bien que l'algèbre de Lie nilpotente $\mathfrak{n} = \sum_{\gamma > 0} \mathfrak{g}_\gamma$ a pour générateurs les champs $\bar{X}_i$, $1 \leq i \leq n$.

Les coordonnées stéréographiques et sphériques sont liées par les relations

$$s_n = \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n}{1 - \cos \theta_n}, \quad s_{n-i} = \frac{\cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n}{1 - \cos \theta_n}, \quad 1 \leq i \leq n-1.$$

Nous obtenons alors par des calculs directs

$$-X_0 = -\sin \theta_n \frac{\partial}{\partial \theta_n};$$

$$- \text{pour } 1 \leq i \leq n-1,$$

$$\begin{aligned} \bar{X}_{n-i} = & -(1 + \cos \theta_n) \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \sin \theta_n} \frac{\partial}{\partial \theta_i} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \cos \theta_j \frac{\partial}{\partial \theta_j} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \frac{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_{n-1}}{\sin \theta_i} \cos \theta_i \frac{\partial}{\partial \theta_n}; \end{aligned}$$

- et enfin,

$$\begin{aligned} \bar{X}_n = & (1 + \cos \theta_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \frac{\partial}{\partial \theta_i} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial}{\partial \theta_n}. \end{aligned}$$

4.1.2. Dérivée de Lie de degré λ . — Nous pouvons à présent décrire les actions $L_{X_0}^\lambda$ et $L_{\bar{X}_i}^\lambda$, $1 \leq i \leq n$ en termes de coordonnées sphériques : nous avons, en appliquant (1),

$$L_{X_0}^\lambda = -\sin \theta_n \frac{\partial}{\partial \theta_n} - \lambda \cos \theta_n,$$

l'opérateur $\cos \theta_n$ du membre de droite étant un simple opérateur de multiplication. De même, pour $1 \leq i \leq n-1$,

$$\begin{aligned} L_{\bar{X}_{n-i}}^\lambda = & -(1 + \cos \theta_n) \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \sin \theta_n} \frac{\partial}{\partial \theta_i} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \cos \theta_j \frac{\partial}{\partial \theta_j} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \frac{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_{n-1}}{\sin \theta_i} \cos \theta_i \frac{\partial}{\partial \theta_n} \\ & + \lambda \left(- (1 + \cos \theta_n) \frac{\cos \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} \right. \\ & \quad \left. - (1 + \cos \theta_n) \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \sin \theta_j \right. \\ & \quad \left. - \sin \theta_n \cos \theta_i \frac{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_{n-1}}{\sin \theta_i} \right); \end{aligned}$$

et enfin :

$$\begin{aligned} L_{\bar{X}_n}^\lambda = & (1 + \cos \theta_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \frac{\partial}{\partial \theta_i} \\ & + (1 + \cos \theta_n) \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial}{\partial \theta_n} \\ & + \lambda \left(- (1 + \cos \theta_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \sin \theta_i \right. \\ & \quad \left. - \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n \right). \end{aligned}$$

Nous sommes à présent à même de démontrer l'identification de la dérivée de Lie de degré λ à la représentation infinitésimale associée à une représentation particulière de la série sphérique nonunitaire du groupe $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, que nous allons déterminer.

DÉFINITION 4.1. — Nous désignons par $\mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n)$ le sous-module de $\mathcal{L}^2(\mathbb{S}^n)$ formé des éléments de classe $\mathcal{C}^\infty$, muni de la représentation $d\mathrm{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu) = dI_\nu$ de $\mathfrak{g}$, et de la représentation régulière à gauche de K , donnée par (3).

Nous nous proposons ici de démontrer l'équivalence des $\mathfrak{g}$ - et K -modules $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ et $\mathcal{C}_{n\lambda}^\infty(\mathbb{S}^n)$.

4.2. Un résultat de cohomologie. — Pour les définitions cohomologiques, on pourra consulter l'ouvrage [6] de M. Fuks.

Nous donnons avant tout un résultat général, qui affirme que deux représentations de $\mathfrak{g}$ qui diffèrent de la dérivée de Lie par deux cocycles cohomologues sont équivalentes (L_X désigne la dérivée de Lie le long du champ X).

LEMME 4.2. — Soient c_1 et $c_2 \in \mathbf{H}^1(\mathfrak{o}(n+1, 1), \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n))$. Nous avons

$$\bar{c}_1 - \bar{c}_2 = \bar{0} \Rightarrow L_X + c_1 \cong L_X + c_2.$$

En effet, par hypothèse il existe $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ tel que $c_1 - c_2 = d\varphi$. Alors l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n) &\longrightarrow \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n) \\ f &\longmapsto e^\varphi f \end{aligned}$$

entrelace les actions $L_X + c_1$ et $L_X + c_2$: nous avons $c_1(X) - c_2(X) = L_X \varphi$ pour tout X , de sorte que

$$\begin{aligned} L_X + c_2(X)(e^\varphi f) &= e^\varphi L_X f + L_X(\varphi)f \cdot e^\varphi + c_2(X)f e^\varphi \\ &= e^\varphi \left(L_X f + L_X(\varphi)f + c_2(X)f \right) \\ &= e^\varphi \left(L_X f + c_1(X)f \right), \end{aligned}$$

ce qui démontre le lemme 4.2.

Notre démonstration de l'équivalence est basée sur deux équivalences successives.

4.3. Première étape. — Notons tout d'abord M^ν la représentation de l'algèbre de Lie conforme sur $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ donnée en coordonnées sphériques par l'action

$$M_X^\nu = L_X + \nu \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n}$$

(on notera que λ n'intervient pas dans cette action). Une première étape dans notre démarche est donnée par le lemme suivant :

LEMME 4.3. — Les représentations dI_ν et M^ν sont équivalentes.

En effet nous identifions les bases vectorielle et matricielle de $\mathfrak{o}(n+1, 1)$ par la correspondance $X_0 \mapsto H$, $\bar{X}_n \mapsto -\mathbf{n}_1$ et $\bar{X}_{n-i} \mapsto -\mathbf{n}_{i+1}$, $1 \leq i \leq n-1$, si bien qu'à l'aide des formules (19), (20) et (21), nous obtenons directement pour tout $X \in \mathfrak{o}(n+1, 1)$

$$\pi \circ dI_\nu(X) = M_X^\nu \circ \pi,$$

où

$$\begin{aligned} \pi : \mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n) &\longrightarrow \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n) \\ f(\theta_1, \dots, \theta_n) &\longmapsto f(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}, \pi + \theta_n)(d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n)^\lambda. \end{aligned}$$

Il nous reste à présent à démontrer que les représentations M_X^ν et L_X^λ , qui s'effectuent toutes deux sur $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$, sont équivalentes si et seulement si $\nu = n\lambda$. Nous nous appuierons à cet effet sur le lemme 4.2.

4.4. Deuxième étape et équivalence. — Avant tout, constatons les deux faits suivants, vérifiés pour tout $X = \sum_i X^i \frac{\partial}{\partial \theta_i}$ de l'algèbre de Lie $\mathfrak{o}(n+1, 1)$:

- L_X^λ est du type $L_X + c_1(X)$, avec $c_1(X) = \lambda \text{Div} X$, où $\text{Div} X = \sum_i \frac{\partial X^i}{\partial \theta_i}$;
- M_X^ν est du type $L_X + c_2(X)$, avec $c_2(X) = \nu \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n}$.

Nous avons donc avec ces notations

$$c_1(X) - c_2(X) = \lambda \left(\text{Div} X - \frac{\nu}{\lambda} \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n} \right).$$

Nous allons à présent prouver que $\text{Div} X - \frac{\nu}{\lambda} \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n}$ est un cobord dans l'espace de cohomologie $H^1(\mathfrak{o}(n+1, 1), \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n))$. Nous prouvons précisément que c'est le cas si et seulement si $\nu = n\lambda$.

PROPOSITION 4.4. —

$$\text{Div} X - \alpha \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n} \in \bar{0} \in H^1(\mathfrak{o}(n+1, 1), \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)) \iff \alpha = n.$$

En effet, si nous écrivons l'équation

$$(22) \quad \text{Div}(X) - \alpha \frac{\partial X^n}{\partial \theta_n} = d\varphi(X)$$

pour chaque élément X de $\mathfrak{o}(n+1, 1)$, nous obtenons les $n+1$ équations suivantes :

– pour $X = \bar{X}_n$,

$$\begin{aligned} & (\alpha - 1) \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_n - (1 + \cos \theta_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \sin \theta_i \\ &= (1 + \cos \theta_n) \left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_i} + \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n} \right); \end{aligned}$$

– pour les $\bar{X}_{n-i}$, $1 \leq i \leq n-1$, nous avons $n-1$ équations indexées par i :

$$\begin{aligned}
& (\alpha - 1) \cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n \\
& - (1 + \cos \theta_n) \left(\frac{\cos \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} \right. \\
& \quad \left. + \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \sin \theta_j \right) \\
(23) \quad & = (1 + \cos \theta_n) \left(- \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_i} \right. \\
& \quad \left. + \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \cos \theta_i \cos \theta_j \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_j} \right. \\
& \quad \left. + \cos \theta_i \sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n} \right); \\
& - \text{enfin, pour } X = X_0, \\
& \quad (\alpha - 1) \cos \theta_n = - \sin \theta_n \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n}.
\end{aligned}$$

Le système linéaire formé de ces $n+1$ équations admet une unique solution donnée par

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_k} = -\frac{k-1}{\tan \theta_k}, & k = 1, \dots, n \\ \alpha = n. \end{cases}$$

En effet, pour résoudre ce système nous pouvons procéder de la façon suivante :

- Appelons S_1 le système donné ci-dessus, et numérotions de (1) à $(n+1)$ les équations, dans l'ordre décrit : ainsi, l'équation (1) est obtenue en appliquant l'équation (22) au champ $\bar{X}_n$, et pour i variant de 2 à n , l'équation (i) est obtenue en appliquant cette équation (22) au champ $\bar{X}_{n-i+1}$. Enfin, l'équation $(n+1)$ est obtenue par ce même procédé, au moyen du champ X_0 .
- 1. Multiplions l'équation (1) par $\cos \theta_1$, et soustrayons au résultat obtenu le produit de l'équation (2) par $\sin \theta_1$: nous obtenons $\frac{\partial \varphi}{\partial \theta_1} = 0$.
- 2. Multiplions l'équation (1) par $\sin \theta_1$, et additionnons au résultat obtenu le produit de l'équation (2) par $\cos \theta_1$: nous obtenons une nouvelle équation, où ne figurent plus les termes où apparaissait l'angle θ_1 . Nous construisons alors un système S_2 , composé de n équations numérotées de (2) à $(n+1)$, où cette nouvelle équation porte le numéro (2), et les autres équations sont inchangées par rapport au système S_1 .

- Répétons le procédé décrit ci-dessus, permettant, pour i de (1) à $(n-1)$, de passer du système S_i au système S_{i+1} : dans S_i , les équations sont numérotées de (i) à $(n+1)$. On procède en deux temps :

- $(i) \cos \theta_i - (i+1) \sin \theta_i \iff \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_i} = -\frac{i-1}{\tan \theta_i}$;
- $(i) \sin \theta_i + (i+1) \cos \theta_i$ est l'équation $(i+1)$ du nouveau système S_{i+1} .

Explicitement, l'équation (i) du système S_i est la suivante :

$$\begin{aligned}
 & (\alpha - 1) \sin \theta_i \cdots \sin \theta_n - (1 + \cos \theta_n) \left(\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} + \frac{i-1}{\sin \theta_i \cdots \sin \theta_n} \right. \\
 & \quad \left. + \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \sin \theta_i \sin \theta_j \right) \\
 &= (1 + \cos \theta_n) \left(\frac{\cos \theta_i}{\sin \theta_{i+1} \cdots \sin \theta_n} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_i} \right. \\
 & \quad \left. + \sum_{j=i+1}^{n-1} \frac{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_j}{\sin \theta_1 \cdots \sin \theta_i \sin \theta_j \cdots \sin \theta_n} \sin \theta_i \cos \theta_j \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_j} \right. \\
 & \quad \left. + \sin \theta_i \cdots \sin \theta_{n-1} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n} \right),
 \end{aligned}$$

et l'équation $(i+1)$ du système S_i est simplement (23).

Nous vérifions alors facilement par récurrence les assertions a. et b. ci-dessus.

- Le système S_n s'écrit enfin

$$\begin{aligned}
 (\alpha - 1) \sin \theta_n - (1 + \cos \theta_n) \frac{n-1}{\sin \theta_n} &= (1 + \cos \theta_n) \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n} \\
 (\alpha - 1) \cos \theta_n &= -\sin \theta_n \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n}
 \end{aligned}$$

et ce dernier système admet clairement une solution unique, donnée par

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \theta_n} = -\frac{n-1}{\tan \theta_n} \quad \text{et} \quad \alpha = n.$$

Le système S_1 est ainsi résolu, et la proposition 4.4 est démontrée.

Ainsi en appliquant le lemme 4.2, nous avons démontré que les $\mathfrak{g}$ -modules $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ et $\mathcal{C}_{n\lambda}^\infty(\mathbb{S}^n)$ sont isomorphes. Il est de plus clair que cet isomorphisme est compatible avec l'action de K , puisque l'action du groupe K est donnée sur chaque espace par la même représentation régulière à gauche. Ainsi, si nous

désignons par φ l'isomorphisme de $\mathfrak{g}$ -modules de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ vers $\mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n)$, il vient immédiatement

$$\varphi(k.(f(\theta_1, \dots, \theta_n)(d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n)^\lambda)) = k.\varphi(f(\theta_1, \dots, \theta_n)d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n)^\lambda,$$

pour tout $k \in K$.

Le théorème 1.1 est donc démontré. Nous écrivons

$$L_X^\lambda \cong d\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes n\lambda)(X).$$

Nous décrivons à présent en détail les $(\mathfrak{g}, K)$ -modules de la série sphérique nonunitaire, dans le but de leur identifier ceux de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$.

5. $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples de la série sphérique nonunitaire

Nous devons avant tout donner des indications précises sur les représentations du groupe $K = \text{SO}(n+1)$. Deux cas sont à considérer, selon la parité de $n+1$. Nous ne donnons les détails que pour $n+1 = 2k$, le travail étant similaire pour $n+1$ impair.

Les notations utilisées dans tout ce qui suit sont celles utilisées par M. Guichardet dans ([8], appendice B.10).

5.1. Poids et représentations de $\text{SO}(n+1)$. — Nous posons ici $n+1 = 2k$, c'est à dire $k = [\frac{n+1}{2}]$, où $[p]$ est la partie entière de p .

Rappelons avant tout la définition des racines et poids : Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple, et $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$.

- On dit que $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ est une racine de $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ si le sous-espace $\mathfrak{g}_\alpha$ défini par

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \alpha(H)X \ \forall H \in \mathfrak{h}\}$$

est non réduit à $\{0\}$.

- On dit que $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ est un poids d'une représentation τ de $\mathfrak{g}$ sur un espace V si le sous-espace V_λ défini par

$$V_\lambda = \{v \in V : \tau(H)v = \lambda(H)v \ \forall H \in \mathfrak{h}\}$$

est non réduit à $\{0\}$. Ainsi, une racine de $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ est un poids pour la représentation adjointe dans $\mathfrak{g}$.

En ce qui nous concerne, prenons d'abord une base de l'algèbre $\mathfrak{k} = \mathfrak{o}(n+1)$ et notamment d'une sous algèbre de Cartan : cette sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{h}$ est engendrée par les éléments

$$H_r = i(E_{2r-1, 2r} - E_{2r, 2r-1}), \quad r = 1, 2, \dots, k.$$

Considérons les applications linéaires sur cette sous-algèbre de Cartan données par

$$\varepsilon_r(\lambda_1 H_1 + \dots + \lambda_k H_k) = \lambda_r.$$

Les racines de $(\mathfrak{o}(n+1), \mathfrak{h})$ sont, pour $1 \leq r < s \leq k$, les applications

$$\varepsilon_r - \varepsilon_s, \varepsilon_r + \varepsilon_s, -\varepsilon_r + \varepsilon_s, -\varepsilon_r - \varepsilon_s.$$

Nous ne donnons pas les éléments et sous-espaces radiciels, inutiles ici.

- Les racines positives sont $\varepsilon_r - \varepsilon_s, \varepsilon_r + \varepsilon_s$.
- La plus grande racine est $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ (poids dominant de la représentation adjointe.)
- Les poids fondamentaux ($\mathbb{Z}$ -base du réseau des poids) sont

$$\begin{aligned} \varpi_r &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_r, \quad r = 1, \dots, k-2; \\ \varpi_{k-1} &= \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_{k-1} - \varepsilon_k); \\ \varpi_k &= \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_{k-1} + \varepsilon_k). \end{aligned}$$

Par conséquent si un poids Λ s'écrit

$$\Lambda = \sum_{i=1}^k \lambda_i \varpi_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \varepsilon_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{Z},$$

nous aurons

$$\lambda_1 = \mu_1 - \mu_2, \lambda_2 = \mu_2 - \mu_3, \dots, \lambda_{k-1} = \mu_{k-1} - \mu_k, \lambda_k = \mu_{k-1} + \mu_k.$$

Λ est un poids dominant si et seulement si tous les λ_i sont positifs, ce qui nous donne

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_{k-1} \geq |\mu_k|.$$

Les μ_i sont entiers ou demi-entiers non entiers. Ces poids dominants sont aussi ceux du groupe $\text{Spin}(2k)$, revêtement universel à deux feuillets de $\text{SO}(2k)$. Ceux de $\text{SO}(2k)$ sont obtenus avec les μ_i tous entiers.

Une représentation est caractérisée par son plus haut poids, et ce dernier est forcément un poids dominant. Ainsi une représentation de $\text{SO}(2k)$ est notée

$$D^{m_1, \dots, m_k}, \text{ avec } |m_1| \leq m_2 \leq \cdots \leq m_{k-1} \leq m_k,$$

où nous avons noté $m_1 = \mu_k, m_2 = \mu_{k-1}, \dots, m_k = \mu_1$.

De même, dans le cas où $n+1$ est impair, $n+1 = 2k+1$, on démontre que pour une représentation de $\text{SO}(2k+1)$ on peut noter

$$D^{m_1, \dots, m_k}, \quad 0 \leq m_1 \leq m_2 \leq \cdots \leq m_{k-1} \leq m_k.$$

5.2. $(\mathfrak{g}, K)$ -modules. — Nous donnons tout d'abord quelques indications concernant les $(\mathfrak{g}, K)$ -modules, dont on pourra trouver les détails dans l'ouvrage [11] de M. Knapp par exemple.

Il convient tout d'abord de remarquer que $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ satisfait aux conditions de définition d'un $(\mathfrak{g}, K)$ -module données en introduction de cet article, si ce n'est que tout vecteur de cet espace n'est pas forcément K -fini : en effet, nous avons

une représentation (analytique) que nous notons π de $G = \mathrm{SO}_0(n+1, 1) \subset \mathrm{Diff}(\mathbb{S}^n)$. D'autre part dans G nous avons

$$k \exp(tX) k^{-1} = \exp(\mathrm{Ad} k \cdot tX)$$

pour tous $k \in K$, $t \in \mathbb{R}$, $X \in \mathfrak{g}$ (voir par exemple [1], par. 6, cor. 2). En prenant la dérivée en $t = 0$ de $\pi(k \exp(tX) k^{-1}) \cdot v$, la différentielle $d\pi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{End}(\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n))$ est telle que l'on obtient

$$d\pi(\mathrm{Ad}(k) \cdot X) \cdot v = k \cdot (d\pi(X) \cdot (k^{-1} \cdot v)).$$

Lorsque K agit au moyen d'opérateurs unitaires la représentation π de G restreinte à K se décompose en somme directe orthogonale d'espaces sur lesquels elle est irréductible, et la multiplicité de chaque représentation est bien définie :

$$(24) \quad \pi|_K \cong \sum_{\tau \in \hat{K}} n_\tau \tau$$

où $\hat{K}$ est l'ensemble des classes d'équivalence des représentations irréductibles de K et où chaque multiplicité n_τ est un entier positif ou est $+\infty$. Un vecteur d'un de ces irréductibles K -espaces est K -fini, de sorte que l'espace des vecteurs K -finis est dense dans E . Les classes d'équivalence τ dans (24) de multiplicité non nulle sont appelées les K -types de π , et $n_\tau \tau$ est la composante isotypique de type τ .

Une telle représentation π est dite admissible si $\pi(K)$ opère par des opérateurs unitaires et si chaque τ dans $\hat{K}$ est de multiplicité finie.

Nous allons voir que c'est le cas pour ce qui nous concerne : M. Vilenkin a démontré dans [15] que la représentation régulière à gauche de $\mathrm{SO}(n+1)$ est unitaire pour le produit scalaire usuel dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{S}^n)$ et se décompose en la somme directe

$$\mathcal{H}(K) = \bigoplus \mathcal{H}^{n+1, m}, \quad m \in \mathbb{N}$$

des sous K -modules $\mathcal{H}^{n+1, m}$ des polynômes harmoniques homogènes en les coordonnées cartésiennes, chacun de ces sous-modules étant simple (excepté pour le cas $n = 1$ où $\mathcal{H}^{2, m}$ est somme directe de deux sous-modules simples de dimension 1, du fait du caractère abélien de $\mathrm{SO}(2)$), et de multiplicité 1. L'isomorphisme donné par le théorème 1.1 nous montre donc que notre représentation est admissible, à condition bien sûr d'avoir prouvé que les $\mathcal{H}^{n+1, m}$ décrivent de manière exhaustive l'espace des vecteurs K -finis.

5.3. $(\mathfrak{g}, K)$ -modules pour $\mathrm{Ind}_{MAN}^G(\mathbf{0} \otimes \nu + \rho)$. — Afin que nos notations soient en accord avec celles données dans ([8], appendice B.10), nous étudions la représentation induite par le caractère $a^{\rho+\nu}$ de A et non a^ν comme nous l'avions fait auparavant. Ainsi, nous étudions les vecteurs K -finis de la représentation

$\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu + \rho)$, et non $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu)$. Il convient de noter dès à présent que nous avons démontré l'équivalence

$$L_X^\lambda \cong d\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes n\lambda)(X).$$

Aussi nous faudra-t-il remplacer $\nu + \rho$ par $n\lambda$ dans les résultats qui suivent.

Notons $E_{0,\nu}$ le $(\mathfrak{g}, K)$ -module des vecteurs K -finis de $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu + \rho)$. Nous avons

$$(25) \quad E_{0,\nu}|_K = \bigoplus D^{0,\dots,0,m}, \begin{cases} m \in \mathbb{N} \text{ pour } n > 1 \\ m \in \mathbb{Z} \text{ pour } n = 1 \end{cases}$$

REMARQUE 5.1. — Nous utilisons la propriété fondamentale $E_{0,\nu}^* \cong E_{0,-\nu}$ (dual K -fini).

5.3.1. *Résultats pour $G = \text{SO}_0(2, 1)$.* — Nous référant à ([8], appendice B.10), nous posons $n_1 = +\infty$, et interprétons les résultats donnés pour $n = 2k$.

Suite de composition de $E_{0,\nu}$:

$E_{0,\nu}$ est simple ssi $\nu \notin \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$. Dans le cas contraire, il admet trois sous-quotients simples notés $E_{0,\nu}^0$, $E_{0,\nu}^+$, $E_{0,\nu}^-$. Leurs restrictions à K sont les suivantes :

- L'entier m de $E_{0,\nu}^0$ est caractérisé par $|m| \leq |\nu| - \frac{1}{2}$.
- Celui de $E_{0,\nu}^\pm$ par $|\nu| + \frac{1}{2} \leq \pm m$.
- $E_{0,\nu}^0$ est un sous-module de $E_{0,\nu}$ si $\nu < 0$, et un quotient si $\nu > 0$.
- Les trois sous-quotients donnés ci-dessus sont des $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples.
- Les sous-modules de dimension finie de $E_{0,\nu}$ sont les $E_{0,\nu}^0$, pour $\nu < 0$.

Les modules unitaires sont :

- $E_{0,\nu}$ pour ν imaginaire pur (série principale unitaire).
- $E_{0,\nu}$ pour $\nu \in]0, \frac{1}{2}[$ (série complémentaire).
- $E_{0,\frac{1}{2}}^0$.
- $E_{0,\nu}^\pm$ pour $\nu \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ (série discrète).

5.3.2. *Résultats pour $G = \text{SO}_0(n+1, 1)$, $n > 1$.* — Utilisant les mêmes notations, nous constatons que les cas $n+1 = 2k$ et $n+1 = 2k+1$ donnent pour ce qui nous concerne les mêmes résultats, qui sont les suivants :

Suite de composition de $E_{0,\nu}$:

- Si n est pair, $E_{0,\nu}$ est simple ssi $\nu \notin \mathbb{Z}$ ou $\nu = \pm(0, 1, \dots, \frac{n}{2} - 1)$;
- Si n est impair, $E_{0,\nu}$ est simple ssi $\nu \notin \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ ou $\nu = \pm(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots, \frac{n}{2} - 1)$;

Dans le cas contraire, c'est à dire si $\nu = \pm(\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1, \dots)$, il admet deux sous-quotients simples notés $E_{0,\nu}^0$ et $E_{0,\nu}^\times$. L'entier m de $E_{0,\nu}^0$ est caractérisé par $m \leq |\nu| - k + \frac{1}{2}$, et celui de $E_{0,\nu}^\times$ par $m \geq |\nu| - k + \frac{3}{2}$.

$E_{0,\nu}^0$ est un sous-module de dimension finie de $E_{0,\nu}$ si $\nu < 0$, et un quotient si $\nu > 0$, et on obtient ainsi les sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -modules de $E_{0,\nu}$.

Les modules unitaires sont les suivants :

- $E_{0,\nu}$ pour ν imaginaire pur (série principale unitaire).
- $E_{0,\nu}$ pour $\nu \in]0, \frac{n}{2}[$ (série complémentaire).
- $E_{0,\frac{n}{2}}^0$.

De cette classification exhaustive des $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples et unitaires de $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu + \rho)$, nous allons déduire la classification inhérente au module $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$.

6. Preuve du théorème 1.2

A l'aide du théorème 1.1, nous pouvons identifier les vecteurs K -finis de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ à ceux de $\mathcal{C}_\nu^\infty(\mathbb{S}^n)$, de la manière suivante :

6.1. Vecteurs K -finis. — Nous utilisons les notations données précédemment. Posons

$$\mathcal{H}^{n+1,m} = \left\{ \frac{P_m(x_0, \dots, x_n)}{(x_0^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{m}{2} + \lambda \frac{n+1}{2}}} \right\} \in C_{-\lambda(n+1)}^\infty(\mathbb{R}^{n+1}),$$

où P_m décrit l'ensemble des polynômes harmoniques et homogènes de degré m en les coordonnées $x_0, \dots, x_n$.

$\mathcal{H}^{n+1,m}$ est considéré comme sous-espace de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ à l'aide du “relèvement” (4). Nous considérons cet espace comme K -module, i.e. comme $\text{SO}(n+1)$ -module, avec la représentation régulière $(k_0 \cdot f)(k) = f(k_0^{-1}k)$. Le K -module $\mathcal{H}^{n+1,m}$ est simple pour $n > 1$, et pour $n = 1$, il est la somme directe de deux K -modules simples, notés H_m et H_{-m} , engendrés respectivement par l'élément $(x_0 + \mathbf{i}x_1)^m (x_0^2 + x_1^2)^{-\frac{m}{2} - \lambda}$, et par son conjugué.

Des vérifications directes (voir par exemple [7], théorème 5.2.4, ou encore [11], page 89) montrent les faits suivants :

- Si $n = 1$, $H_{\pm m} \cong D^{\pm m}$;
- Si $n > 1$, $\mathcal{H}^{n+1,m}$ est un K -module de plus haut poids $m\varepsilon_1$, avec l'élément primitif

$$\psi_{1m} = \frac{(x_0 + \mathbf{i}x_1)^m}{(x_0^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{m}{2} + \lambda \frac{n+1}{2}}}.$$

Ainsi $\mathcal{H}^{n+1,m} \cong D^{0, \dots, 0, m}$.

Posons

$$\mathcal{H}(K) = \bigoplus_m \mathcal{H}^{n+1,m}$$

Nous savons que l'espace des vecteurs K -finis de la représentation induite $\text{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu + \rho)$ est donné par (25). Par l'équivalence démontrée, nous pouvons énoncer le résultat suivant :

PROPOSITION 6.1. — *Le $(\mathfrak{g}, K)$ -module des vecteurs K -finis de l'espace des densités tensorielles sur la sphère est isomorphe à l'espace $\mathcal{H}(K)$ des polynômes harmoniques en les coordonnées cartésiennes sur la sphère.*

6.2. Classification. — Nous achevons au moyen des résultats précédents la démonstration du théorème 1.2 :

- Cas $n = 1$: $E_{0,\nu}^0 = \bigoplus_{|m| \leq |\nu| - \frac{1}{2}} H_m$. Cet espace est un sous-module simple de dimension finie pour $\nu \in \frac{1}{2} - \mathbb{N}$. Ainsi, si $\nu = -\frac{1}{2} - l$, $l \in \mathbb{N}$, nous avons $\nu + \rho = -l$ (pour $\mathrm{SO}_0(n+1, 1)$, $\rho = \frac{n}{2}$), d'où $|m| \leq |\nu| - \frac{1}{2} \iff |m| \leq l$. Par conséquent nous obtenons le sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple de dimension finie qui est la somme directe de K -modules simples $\bigoplus_{|m| \leq l} H_m$ pour $\lambda = -l$, dans $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^1)$, ce qui correspond à l'ensemble des polynômes harmoniques homogènes de degré $\leq l$ en les coordonnées cartésiennes x_0, x_1 .

De la même façon, les autres sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -modules simples sont obtenus pour $\lambda = l$, $l \in \mathbb{N}^*$, et sont les sous-espaces donnés par $E_{0,\nu}^+|_K = \bigoplus_{l \leq m} H_m$ et $E_{0,\nu}^-|_K = \bigoplus_{-m \leq -l} H_{-m}$. Remarquons que la somme directe de $E_{0,\nu}^+$ et $E_{0,\nu}^-$ est l'ensemble des polynômes harmoniques de degré $\geq l$.

- Cas $n > 1$:
 - Si $\nu = -\frac{n}{2} - l$, $l \in \mathbb{N}$, ce qui équivaut à $\nu + \rho = -l$, il existe un unique sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple de $\mathcal{H}(K)$, de dimension finie, donné par le sous-espace $E_{0,\nu}^0|_K = \bigoplus_{m \leq |\nu| - \frac{n}{2}} \mathcal{H}^{n+1,m}$. Ce sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^n)$ est donc donné, pour $l + n\lambda = 0$, par l'ensemble des polynômes harmoniques homogènes de degré $\leq l$ en les coordonnées cartésiennes (en effet $m \leq |\nu| - \frac{n}{2} \iff m \leq -n\lambda$).
 - Si $\nu = \frac{n}{2} + l$, $l \in \mathbb{N}$, ce qui équivaut à $\nu + \rho = l + n$, on obtient un unique sous- $(\mathfrak{g}, K)$ -module simple de dimension infinie, qui est l'espace des polynômes harmoniques homogènes de degré $\geq l + 1$; ce cas correspond à la valeur $n\lambda = l + n \iff \lambda = 1 + l/n$.

Il reste à traduire les conditions d'unitarisabilité de chacun de ces $(\mathfrak{g}, K)$ -modules. Nous obtenons facilement les résultats du théorème 1.2, en interprétant les résultats de classification des $(\mathfrak{g}, K)$ -modules pour $\mathrm{Ind}_{MAN}^G(0 \otimes \nu + \rho)$ avec l'égalité $\nu + \rho = n\lambda$. Par exemple, l'assertion $\nu \in]-\frac{n}{2}, \frac{n}{2}[\setminus \{0\}$ équivaut à $\nu + \rho \in]0, n[\setminus \{\frac{n}{2}\}$, c'est à dire $\lambda \in]0, 1[\setminus \{\frac{1}{2}\}$. Les autres assertions d'unitarisabilité s'obtiennent de la même manière.

Le théorème 1.2 est démontré.

REMARQUE 6.2. — Le cas $n = 1$ peut être déduit directement de la classification des représentations de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$: adoptant la démarche de M. Lang

dans [12], il convient à cet effet d'observer que l'espace des vecteurs K -finis de $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{S}^1)$ est la somme $\bigoplus H_{2l}$, $l \in \mathbb{Z}$, où H_m est l'espace de la représentation de $\mathrm{SO}(2) \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ de caractère

$$\chi_m : \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \mapsto e^{im\theta}.$$

Remerciements : L'auteur tient à remercier vivement Thierry Levasseur, Alain Guichardet et Valentin Ovsienko pour leur grande disponibilité, ainsi que Raneë Brylinski, Patrick Delorme et Pierre Lecomte pour d'enrichissantes discussions.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Bourbaki, *Algèbre Chap. 3, Groupes de Lie*.
- [2] J. Dixmier, *Algèbres enveloppantes*, Gauthier-Villars, Paris, (1973).
- [3] C. Duval, P. Lecomte & V. Ovsienko, *Conformally equivariant quantization : existence and uniqueness*, Ann. Inst. Fourier. **49 :6** (1999) 1999–2029.
- [4] B. Doubrovine, S. Novikov, A. Fomenko, *Géométrie contemporaine*, MIR, Moscou, (1982).
- [5] M. G. Eastwood & J.W. Rice, *Conformally invariant differential operators on Minkowski space and their curved analogues*, ComM. Math. Phys. **109 :2** (1987), 207–228.
- [6] D.B. Fuks, *Cohomology of infinite dimensional Lie algebras*, Kluwer Academic Publishers, 1986.
- [7] R. Goodman, N. Wallach, *Representations and Invariants of the Classical Groups*, Cambridge Univ. Press, (1998).
- [8] A. Guichardet, *Cohomologie des groupes topologiques et des algèbres de Lie*, Cedric/Nathan (1980).
- [9] T. Hirai, *On irreducible representations of the Lorentz group of nth order*, Proc. Japan Acad. **38**, (1962), 258–262
- [10] A.U. Klimyk, A.M. Gavrilik, *Representation of the group $\mathrm{SO}(p, q)$* , Acad. Kiev, (1976).
- [11] A. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups, an overview based on examples*, Princeton university press, (1986).
- [12] S. Lang, *$\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$* , Springer, Graduate texts in Mathematics, Vol.105 (1975).
- [13] V. Ovsienko, P. Redou, *Generalized Transvectants-Rankin-Cohen Brackets*, À paraître (2001).

- [14] V. Ovsienko, *Exotic Deformation Quantization*, J. Diff. GeoM. , **45 :2** (1997) 390–406.
- [15] N. Ja. Vilenkin, *Fonctions spéciales et théorie de la représentation des groupes*, Dunod (1969).
- [16] N. Ja. Vilenkin, A.U. Klimyk, *Representation theory and noncommutative harmonic analysis II*, Springer, Encyclopædia of Mathematical Sciences, Vol.59 (1988).